



Съгласие за екстракция на зъби

Екстракцията на зъби е невъзвратим процес и независимо дали е рутинна или затруднена, тя е хирургична манипулация. Както всяка друга хирургична интервенция, тя крие някои рискове. Те включват, но не се ограничават само със следното:

1. Подуване и/или натъртване (посиняване) и дискомфорт в оперативната област
2. Разтягане на ъглите на устата, изразяващо се с появата на цепнатини и натъртване (посиняване)
3. Възможна инфекция, изискваща по-нататъшно лечение.
4. Суша алвеола – болка в челюстта, започваща няколко дни след хирургическата анипулация, обикновено изисква допълнителни грижи. По-често се среща при вадене на долни зъби, особено мъдреци.
5. Възможно е повреждане на съседни зъби, особено такива с големи пломби или коронки.
6. Скованост или променена чувствителност в зъби, устни, език и брадичка, дължаща се на близостта на зъбните корени (особено тези на мъдреците) до нервите, които могат да бъдат притиснати и/или наранени. Най-често чувствителността се възстановява до нормална, но в редки случаи загубата ѝ може да бъде постоянна.
7. Тризмус – ограничено отваряне на устата, дължащо се на възпаление или подуване, най-често след отстраняване на мъдреци. Понякога той е резултат на дискомфорт в челюстната става (ТМС), особено когато заболяване със съответните симптоми на ТМС вече съществува.
8. Кървене – значително кръвотечение не се наблюдава често, но може да се очаква непрекъснато слабо процеждане на кръв за няколко часа.
9. Остри ръбове или костни парченца могат да се покажат по-късно на ръба на алвеолата. Това може да изисква допълнителна хирургична интервенция за тяхното загладяване и/или отстраняване.
10. Напълно отстраняване на зъбни фрагменти – за да се избегне нараняване на жизнено важни структури като нерви или синуси, понякога малки коренови връхчета могат да бъдат оставени на място. Засягане на синус: корените на горните задни зъби са често в близост до синуса и понякога парченце от корен може да попадне в него, или пък да се получи отвор към устната кухина, което може да изисква допълнителни грижи.
11. Счупване на челюст – въпреки че е съвсем рядко, възможно е да се случи при трудни за вадене и/или дълбоко включени в костта зъби.

Повечето процедури са рутинни и сериозни усложнения не се очакват. Ако все пак се появят усложнения, те най-често са леки и подлежат на лечение.

Зъби, които трябва да бъдат извадени:

Алтернативи на горепосоченото лечение:

.....

Подпис на пациента (законен настойник):

Дата:

Име и подпис на денталния лекар:

Дата:

Име и подпис на свидетеля:

Дата: